



## PREVALÊNCIA DA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES EM PACIENTES ATENDIDAS EM PRÉ-NATAL DE ALTO RISCO EM CIDADE DO RECÔNCAVO DA BAHIA

XXIII Congresso Baiano de Obstetrícia e Ginecologia, 0ª edição, de 07/10/2022 a 08/10/2022  
ISBN dos Anais: 978-65-81152-94-9

**ALMEIDA; João Pedro Ferreira Pinho de <sup>1</sup>, ROCHA; Marla Niag dos Santos <sup>2</sup>, CRUZ; Marcos André Medrado da <sup>3</sup>, OLIVEIRA; Jessica Mariana Lima de <sup>4</sup>, PEREIRA; Paula Vieira <sup>5</sup>, FERREIRA; Valéria Dantas Alves <sup>6</sup>, SANTOS; Kleber Pimentel <sup>7</sup>, TOZETTO; Sibebe de Oliveira <sup>8</sup>**

### RESUMO

**Introdução:** Os fatores de risco gestacionais podem e devem ser rastreados e identificados no decorrer do pré-natal através da anamnese, exame físico geral, exame gineco-obstétrico e de exames complementares. A garantia do acesso aos exames complementares preconizados na rotina do pré-natal (pelo Ministério da Saúde ou pelas sociedades das sub-especialidades) pode minimizar a probabilidade da ocorrência de condições obstétricas desfavoráveis. **Objetivo:** Determinar a frequência de realização de exames complementares morfológicos, doppler de artérias uterinas e cervicometria, através de análises de prontuários de pacientes atendidas no pré-natal de alto risco (PNAR) em cidade do Recôncavo da Bahia. **Método:** Trata-se de um estudo retrospectivo de corte transversal realizado através da análise de 249 prontuários de pacientes atendidas no PNAR da Policlínica Regional de Saúde (RECONVALE), entre 2018 e 2020. A tabulação foi realizada no programa Microsoft Excel versão 2013 e a análise estatística posterior, pelo Statistical Package for Social Sciences versão 23.0. **Resultados:** Analisando os 249 prontuários, observou-se que 204/238 (85,7 %) das pacientes não realizaram ultrassonografia morfológica de 1º trimestre; 139/214 (65%) não realizaram morfológica de 2º trimestre; 191/212 (90,1 %) não realizaram cervicometria para identificação de risco de prematuridade; 127/218 (58,3 %) não realizaram exames morfológicos do 1º e/ou 2º trimestre para identificação de marcadores de cromossomopatias e 187/212 (88,2 %) das pacientes não realizaram Doppler de artérias uterinas para identificar risco elevado de restrição de crescimento intrauterina (RCIU) e pré-eclâmpsia (PE), enquanto 7/212 (3,3%) das gestantes que realizaram o exame identificaram risco elevado para RCIU e PE e 7/218 (3,2%) das que realizaram exames morfológicos do 1º e/ou 2º trimestre identificaram marcadores maiores ou menores de cromossomopatias. **Conclusão:** Foi possível inferir através do estudo que a maioria das gestantes não realizaram os exames complementares durante o PNAR, que apesar de não enquadrados como obrigatórios e de solicitação universal pelo Ministério da Saúde, são considerados assim pelas sociedades das sub-especialidades. Tal fato demonstra que, apesar dos avanços das ações da Rede Cegonha, há necessidade de fortalecer a assistência pré-natal, otimizar o acesso e realização das investigações dentro do período oportuno para solicitação e realização dos exames complementares no PNAR em cidade do Recôncavo da Bahia.

**PALAVRAS-CHAVE:** Cuidado Pré-Natal, Gravidez de alto risco, Saúde da Mulher, Diagnósticos e Exames Laboratoriais, Técnicas e Procedimentos Diagnósticos

<sup>1</sup> Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), jppinho.15@gmail.com

<sup>2</sup> Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), marlania@yahoo.com.br

<sup>3</sup> Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), marcosmedrado65@gmail.com

<sup>4</sup> Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), jessicamariana213@gmail.com

<sup>5</sup> Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), Paulavieira@aluno.ufrb.edu.br

<sup>6</sup> Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), valeriad\_alves@hotmail.com

<sup>7</sup> Universidade Federal da Bahia (UFBA), kleberepidemio@gmail.com

<sup>8</sup> Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), sibebe.tozetto@gmail.com