

## FORÇA DE PRENSÃO MANUAL E FATORES CLÍNICOS E NUTRICIONAIS DOS INDIVÍDUOS TRANSPLANTADOS RENAIIS

Congresso Interdisciplinar em Obesidade e Terapia Nutricional, 1ª edição, de 03/05/2022 a 07/05/2022  
ISBN dos Anais: 978-65-81152-57-4

**MARTINS; Cleodice Alves <sup>1</sup>, OLIVEIRA; Maria Thairle dos Santos de <sup>2</sup>, PEREIRA; Tatiana Menezes <sup>3</sup>, LEITE; Flaviana Martins Leite <sup>4</sup>, DIAS; Raimunda Sheyla Carneiro <sup>5</sup>**

### RESUMO

A força de prensão manual (FPM) é um importante indicador nutricional da função muscular, que normalmente encontra-se reduzida nos indivíduos renais. Com base nisso, torna-se importante avaliar a sua adequação e a sua associação com o estado nutricional e fatores clínicos na população transplantada renal. Trata-se de um estudo transversal realizado com 255 indivíduos transplantados renais de um centro de prevenção em doenças renais no nordeste do Brasil. O estudo obteve o termo de consentimento livre e esclarecido de todos os participantes, além da aprovação pelo comitê de ética e pesquisa. Para a classificação dos pontos de corte para a FPM foi utilizada a referência do consenso europeu de sarcopenia (2018) para identificação da ausência ou presença de depleção da função muscular. E a análise da composição corporal foi realizada através da bioimpedância biolétrica tetrapolar. As variáveis categóricas foram apresentadas por meio de frequências e porcentagens com análise realizada pelo teste do qui-quadrado. A partir disso, foi realizada a regressão logística binária para testar as associações entre as variáveis independentes sexo, idade, índice de massa corporal (IMC) e percentual de massa gorda com a FPM, respeitando os pressupostos de ausência de multicolinearidade e ausência de outliers. Foi adotado o valor de significância de 5%. Como resultados obtivemos na amostra 163 (63,92%) indivíduos com a FPM adequada e 92 (36,07%) indivíduos com a FPM em estado de depleção possuindo significância estatística ( $\chi^2 = 19.769$ ,  $p < 0.001$ ). O modelo de regressão logística binária mostrou que as variáveis de percentual de massa gorda ( $\chi^2 = 3.164$ ), idade ( $\chi^2 = 9.623$ ), sexo ( $\chi^2 = 0.599$ ) e IMC ( $\chi^2 = 7.499$ ) são preditores estatisticamente significativos ( $p < 0,05$ ) para a verificação da função muscular diagnosticada pela FPM. Em nossa amostra, as seguintes categorias: percentual de massa gorda adequado (OR = 1,76 IC 95%: 0,94 - 3,28,  $p < 0.05$ ); os transplantados renais idosos (OR = 0,80, IC 95% 0,45 - 1,40),  $p < 0.001$ ); indivíduos do sexo masculino (OR = 0,80, IC 95%: 0,45 - 1,40,  $p < 0.05$ ); além daqueles com classificação do IMC de desnutrição (OR = 0,29, IC 95%: 0,10 - 0,84,  $p < 0.05$ ) e de excesso de peso (OR = 1,43, IC 95% = 0,77 - 2,65) estão associadas com o aumento da depleção da função muscular diagnosticada pela FPM. Em conclusão,

<sup>1</sup> Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão, cleoalves.01@hotmail.com

<sup>2</sup> Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão, thairlesantos@gmail.com

<sup>3</sup> Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão, menezestathy@gmail.com

<sup>4</sup> Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão, fml.flaviana@gmail.com

<sup>5</sup> Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão, sheylak75@yahoo.com.br

identificamos a necessidade da utilização FPM como suporte para monitoramento e diagnóstico nutricional ao invés de utilizar uma ferramenta isolada, tendo em vista a sua relevância no estado nutricional dos indivíduos transplantados renais.

**PALAVRAS-CHAVE:** Estado nutricional, Força de preensão manual, Transplantados renais