

## REINCIDÊNCIA DE CISTOADENOMA DE OVÁRIO - UM RELATO DE CASO

II Congresso Online de Ginecologia e Obstetrícia da Sogise, 2ª edição, de 01/11/2021 a 03/11/2021  
ISBN dos Anais: 978-65-89908-14-2

**PARREIRA; Bárbara Soares<sup>1</sup>, LAGE; Lívia Ramos<sup>2</sup>, SILVA; Aline Santana da<sup>3</sup>, WERNER; Lucas Alvim<sup>4</sup>, CHAVES; Francisco Roberto<sup>5</sup>**

### RESUMO

**INTRODUÇÃO:** Os tumores ovarianos dividem-se pela origem celular em epitelial, estromal ou germinativo. Os benignos com origem epitelial (50%) são serosos, mucinosos ou endometrioses; os mucinosos classificam-se pela histologia em benigno (80%), borderline (10%) ou maligno (10%), sendo mais comuns em mulheres de 30 a 60 anos e unilaterais. Os cistos ovarianos são assintomáticos em estágios iniciais e apresentam sintomas inespecíficos conforme seu crescimento. **DESCRIÇÃO DO CASO:** Paciente, 32 anos, G2Pc2A0, com cistos ovarianos bilaterais realizou cesariana, anexectomia à esquerda e ooforoplastia à direita em 2017, biópsia evidenciou cistoadenoma papilífero no ovário esquerdo e cistoadenoma papilífero e mucinoso no direito. Em 2021, foi admitida com queixa de volume abdominal aumentado. Ultrassonografia de abdome total demonstrou formação cística volumosa contendo septos completos e incompletos na topografia anexial direita medindo 19,7 x 14,1 x 11,9cm, sem alterações nos marcadores CA 125 e CA19.9. Paciente evoluiu com dor em hemiabdomine direito submetendo-se a laparotomia com histerectomia subtotal abdominal, salpingectomia bilateral, apendicectomia e ooforectomia direita, apresentando torção de ovário. **DISCUSSÃO:** O cistoadenoma mucinoso de ovário pode atingir grandes tamanhos sem relação com malignidade. Quando sintomático, as queixas são de abdome volumoso, dor, alterações urinárias e gastrointestinais e diagnóstico confirmado por ultrassonografia transvaginal. Os marcadores tumorais não são específicos, podendo estar aumentados em casos de malignidade. Sua recorrência é rara após a excisão e a cistectomia pode ser feita em pacientes com cistos pequenos. A histerectomia com salpingo-ooforectomia bilateral é indicada em pacientes com prole definida e em casos de recorrência. A apendicectomia é feita pela associação de tumor de ovário com mucocele do apêndice cecal. **CONCLUSÃO:** Tumores ovarianos normalmente são assintomáticos, o diagnóstico é feito incidentalmente ou quando com compressão de estruturas vizinhas. A conduta depende da idade, da clínica e do desejo de engravidar da paciente, os relatos de recorrência são raros.

**PALAVRAS-CHAVE:** Cistoadenoma mucinoso, Recorrência, Relato de Caso

<sup>1</sup> Acadêmica do curso de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora - SUPREMA, barbara\_soares96@hotmail.com

<sup>2</sup> Acadêmica do curso de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora - SUPREMA, Barbara\_soares96@hotmail.com

<sup>3</sup> Médica residente de Ginecologia e Obstetrícia no Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus, barbara\_soares96@hotmail.com

<sup>4</sup> Médico residente de Ginecologia e Obstetrícia no Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus, barbara\_soares96@hotmail.com

<sup>5</sup> Médico Ginecologista e Obstetra, Docente da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora, Preceptor da residência de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus, barbara\_soares96@hotmail.com