



ABANDONO DE HÁBITOS ORAIS DELETÉRIOS E TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA EM MORDIDA ABERTA ANTERIOR: RELATO DE CASO

14º Encontro Brasileiro de Motricidade Orofacial, 14ª edição, de 02/06/2022 a 04/06/2022

ISBN dos Anais: 978-65-81152-66-6

SCHIAVONI; Laura Battistin¹, ARAÚJO; Mariana Costa², NEDEL; Valquíria Zandoná³, VIEIRA; Danielli Pires⁴, BREDÁ; Juliana Zardo⁵, OLIVEIRA; Giovanna Ketlen Lisboa⁶, ESTERY; Ana Paula Arruda⁷, NETO; José Faibes Lubianca⁸, CARDOSO; Maria Cristina de Almeida Freitas⁹, BERBERT; Monalise Costa Batista¹⁰, BARBOSA; Lisiane De Rosa¹¹, MAAHS; Marcia Angelica Peter¹²

RESUMO

TEMA: Os hábitos orais deletérios (HOD), como a sucção de chupeta e de mamadeira, podem resultar em alterações nos tecidos musculares, dentários e ósseos, influenciando no crescimento e desenvolvimento craniofacial e na oclusão dentária. Tais alterações podem causar impacto negativo no sistema estomatognático (SE), podendo estar associadas à respiração oral (RO), que, por sua vez, também é considerada um HOD. Esta relação ambivalente depende da duração, frequência e intensidade do HOD. **OBJETIVO:** Relatar a correção da mordida aberta anterior (MAA) em uma criança respiradora oral devido ao abandono do hábito da chupeta e da mamadeira, junto a terapia fonoaudiológica, em fase de dentadura decídua. **PROCEDIMENTOS:** Avaliada no ambulatório de Práticas Integradas em Respiração Oral com 2 anos e 3 meses, iniciou abandono dos HOD de chupeta e mamadeira com 3 anos e 6 meses. A abordagem terapêutica abrangeu conscientização e percepção dos hábitos e funções, treino muscular, postura habitual de lábios e língua e adequação da respiração nasal. No que diz respeito às orientações aos responsáveis, foi disponibilizado o “Guia de orientação para remoção de hábitos orais deletérios” e a história “Bico Lino” para diminuição ou remoção do hábito. Por meio do aplicativo “Escova de dentes” indicou-se os passos para higiene oral e atividade supervisionada de escovação correta dos dentes, uso de pasta e fio dental. Relato aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do hospital de origem sob o parecer nº 1.900.382. **RESULTADOS:** As estratégias auxiliaram na diminuição gradual do uso dos HOD. A mamadeira foi substituída pelo copo de bico rígido e a MAA fechou. Porém, após erupção completa o 55 cruzou a mordida, e a paciente foi encaminhada para tratamento ortodôntico preventivo. **CONCLUSÃO:** O abandono dos HOD e a terapia fonoaudiológica precoces levaram ao fechamento completo da mordida aberta anterior.

PALAVRAS-CHAVE: Respiração Bucal, Fonoaudiologia, Chupetas, Mamadeira

¹ Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre- UFCSPA, laurabasc@gmail.com

² Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre- UFCSPA, mariana.costa@ufcspa.edu.br

³ Universidade Federal do Rio Grande do Sul- UFRGS, valquiriaznd@hotmail.com

⁴ Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre- UFCSPA, danielli.vieira@ufcspa.edu.br

⁵ Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre- UFCSPA, julianazbreda@gmail.com

⁶ Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre- UFCSPA, gioketlen19@gmail.com

⁷ Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre- UFCSPA, laurabasc@gmail.com

⁸ Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre- UFCSPA, jlubianca@ufcspa.edu.br

⁹ Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre- UFCSPA, mcardoso@ufcspa.edu.br

¹⁰ Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre- UFCSPA, monalise@ufcspa.edu.br

¹¹ Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre- UFCSPA, lisiane@ufcspa.edu.br

¹² Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre- UFCSPA, marciama@ufcspa.edu.br